



BIOHAR FORTE® SC

INOCULANTE SUELO Y PROMOTOR CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS
BIOINSUMO DE USO AGRÍCOLA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingrediente Activo

Bacillus polymyxa (1 x 10⁸ UFC/mL)
Trichoderma harzianum (0.25 X 10⁸ UFC/mL)
Trichoderma asperellum (0.25 X 10⁸ UFC/mL)
Trichoderma koningii (0.25 X 10⁸ UFC/mL)
Trichoderma viride (0.25 X 10⁸ UFC/mL)

Ingrediente Inerte

Adherentes y surfactantes naturales



*Ficha Técnica Actualizada: 1/11-2022

Registro de venta No. 11930

BIOHAR FORTE® SC

Es un producto PROBIÓTICO de uso agrícola para el suelo, que contiene una mezcla de conidios de hongos y unidades bacteriales, que desempeñan un papel importante en las plantas por su acción como antagonista de patógenos del suelo, la regulación de poblaciones de nematodos y bioestimulantes del desarrollo de las plantas, en la mayoría de los cultivos.

BIOHAR FORTE® SC está compuesto por cepas de Bacillus polymyxa, Trichoderma harzianum, Trichoderma asperellum, Trichoderma koningii y Trichoderma viride, que tienen la capacidad de colonizar la zona de crecimiento de las raíces (rizosfera), estimular el crecimiento, solubilizar fósforo, fijar nitrógeno, controlar algunas enfermedades causadas por hongos, bacterias y controlar nematodos fitoparásitos. La actividad biológica del BIOHAR FORTE® SC se inicia cuando el producto entra en contacto con el suelo en el cual, por división asexual o por medio de los conidios inician el proceso de germinación y colonización.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS c.c./Litro	Forma de aplicación
Aguacate	1 a 2.5 c.c./ Litro	Aplicar al suelo en presiembra y mensualmente después de la siembra en forma de drench, riego por aspersión o goteo.

ALMACENAMIENTO

BIOHAR FORTE® SC debe almacenarse en su envase original y cerrado, en un lugar fresco, seco y sombreado. En estas condiciones dura entre tres y seis meses después de formulado.

PREPARACIÓN

Antes de usarlo se recomienda agitar el BIOHAR FORTE® SC y diluir en uno o dos litros hasta homogenizarlo completamente y luego proceder a completar el volumen deseado. Se debe asegurar que cubra de forma homogénea la planta y el suelo donde se presente problemas de ácaros. Se recomiendan boquillas de alta presión para que se forme una niebla y gotas finas. Para lograr una mayor eficacia del BIOHAR FORTE® SC es preferible aplicarlo como preventivo.

COMPATIBILIDAD

BIOHAR FORTE® SC es compatible con la mayoría de insecticidas. No mezclar con fungicidas de compatibilidad desconocida. Consultar al Departamento Técnico de BIOQUIRAMA sus inquietudes o sugerencias.

PRESENTACIÓN

BIOHAR FORTE® SC se presenta al público en formulación líquida en suspensión concentrada en envases de: 250 c.c., 1, 4 y 20 Litros.

PLAZO DE SEGURIDAD

No requiere período de carencia, pero es recomendable utilizar el equipo mínimo de protección para la aspersión del producto en cultivos. Para mejor efectividad del producto consulte nuestro departamento técnico.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA III